Early Journal Content on JSTOR, Free to Anyone in the World

This article is one of nearly 500,000 scholarly works digitized and made freely available to everyone in the world by JSTOR.

Known as the Early Journal Content, this set of works include research articles, news, letters, and other writings published in more than 200 of the oldest leading academic journals. The works date from the mid-seventeenth to the early twentieth centuries.

We encourage people to read and share the Early Journal Content openly and to tell others that this resource exists. People may post this content online or redistribute in any way for non-commercial purposes.

Read more about Early Journal Content at http://about.jstor.org/participate-jstor/individuals/early-journal-content.

JSTOR is a digital library of academic journals, books, and primary source objects. JSTOR helps people discover, use, and build upon a wide range of content through a powerful research and teaching platform, and preserves this content for future generations. JSTOR is part of ITHAKA, a not-for-profit organization that also includes Ithaka S+R and Portico. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.

très-nombreuses, linéaires, poilues, atténuées à leur base, étalées-dressées; les caulinaires plus petites, engaînantes à leur base. Fleurs d'un jaune brunâtre. Graines ovoïdes, munies au sommet d'un appendice droit. Corymbe lâche, à rameaux inégaux, rameux et souvent multiflores, allongés, filiformes, dressés même après l'anthèse. Divisions périgonales lancéolées, longuement mucronées, brunes et luisantes sur le dos, blanches-scarieuses sur les bords. Capsule verte, ovoïde-trigone, aiguë, mucronée, un peu moins longue que le périgone.

Cette espèce habite les bois et fleurit en mai et juin. Lejeune (in *Fl. Spa*, p. 304) signale cette espèce entre Andrimont et Dison (Liége). Dans la *Revue*, p. 72, il dit que cette plante doit être rayée de la Flore, ayant pris pour elle une variété insignifiante de *Luzula pilosa* Willd.

Elle fut découverte, le 10 mai dernier, dans le bois d'Angre par MM. Boutmann et Lelièvre, botanistes français.

—

Liste des plantes rares ou peu communes qui croissent aux environs de Thielt-Notre-Dame (Brabant), par Armand Thielens.

La commune de Thielt-Notre-Dame est située au nord-est de Louvain. J'ai parcouru presque tout le Brabant, et nulle part je n'ai rencontré une flore aussi riche et aussi variée que celle de ce petit coin favorisé. J'ai dressé le catalogue des plantes que j'ai rencontrées dans cette intéressante localité; il comprend 446 espèces, mais je me bornerai ici à mentionner les plus rares.

Ranunculus hederaceus L. — Ruisseaux, lieux inondés, assez rare.
— *trichophyllos* Chaix. — Fossés, mares, très-rare.
Gypsophila muralis L. — Champs frais, très-rare.
Stellaria graminea L. — Bois, haies, rare.
Cerastium aquaticum L. — Bords des eaux, assez rare.
Radiola linoides Gmel. — Champs humides, assez rare.

Malva moschata L. — Buissons, pelouses, assez rare.
Tilia sylvestris Desf. — Bois, assez rare.
Polygala depressa Wend. — Pelouses, rare.
Hypericum quadrangulum L. — Bois, très-rare.
— *tetrapterum* Fries. — Bords des marais, rare.
Parnassia palustris L. — Prairies marécageuses, très-rare.
Papaver dubium L. — Moissons, assez rare.
— *Lecoqii* Lamotte. — Champs et moissons, très-rare.
Corydalis solida Sm. — Le long des haies, fossés, assez commun.
— *lutea* DC. — Une touffe sur un mur.
Cardamine sylvatica Link. — Bois, très-rare.
Nasturtium palustre DC. — Bords des fossés, assez rare.
— *sylvestre* R.Br. — Lieux humides, rare.
Erysimum cheiranthoides L. — Champs et chemins, assez rare.
Cochlearia Armoracia L. — Naturalisé dans une prairie.
Thlaspi arvense L. — Champs, moissons, assez commun.
— *perfoliatum* L. — Lieux arides, très-rare.
Lepidium campestre R. Br. — Moissons, assez rare.
Viola sylvatica Fries. — Bois, commun.
— *canina* L. — Mélangé à l'espèce précédente, assez rare.
Genista tinctoria L. — Pelouses, assez commun.
Lotus major Scop. — Haies, lieux humides, assez rare.
Melilotus alba Lmk. — Bords des chemins, très-rare.
Vicia sepium L. — Haies, buissons, assez rare.
Peplis Portula L. — Bords des eaux, assez rare.
Montia fontana L. — Terrains humides, très-rare.
Sedum Telephium L. — Bois, très-rare.
Comarum palustre L. — Prés marécageux, assez rare.
Potentilla argentea L. — Chemins, vieux murs, assez rare.
Epilobium roseum Schreb. — Bords des eaux, très-rare.
Isnardia palustris L. — Lieux inondés, très-rare.
Circaea lutetiana L. — Bois, lieux ombragés, assez rare.
Myriophyllum verticillatum L. — Mares, très-rare.
Helosciadium inundatum Koch. — Mares, très-rare.
Selinum carvifolia L. — Mares, rare.
Viscum album L. — Parasite sur le pommier, rare.
Chrysosplenium alternifolium L. — Lieux humides, très-rare.
Erica Tetralix L. — Bruyères, assez commun.
Hottonia palustris L. — Fossés, mares, assez rare.
Anagallis caerulea Schreb. — Lieux cultivés, très-rare.

Ilex Aquifolium L. — Bois, haies, très-rare.
Vinca minor L. — Bois humides, rare.
Menyanthes trifoliata L. — Lieux inondés et tourbeux, assez rare.
Gentiana Pneumonanthe L. — Lieux humides, assez rare.
Cuscuta minor DC. — Sur le thym et la bruyère, assez rare.
Myosotis stricta Link. — Lieux sablonneux, très-rare.
Solanum Dulcamara L. — Buissons, assez rare.
Datura Stramonium L. — Terrains incultes, assez rare.
Hyoscyamus niger L. — Voisinage des habitations, rare.
Verbascum thapsiforme Schrad. — Chemins et lieux pierreux, très-rare.
Veronica polita Fries. — Champs, assez rare.
— *scutellata* L. — Lieux marécageux, assez rare.
Scrophularia umbrosa Dmrt. — Bords des eaux, très-rare.
Digitalis purpurea L. — Bois et bords des chemins, rare.
Linaria Elatine Desf. — Champs, fossés, assez rare.
Pedicularis sylvatica L. — Bruyères et pelouses, assez rare.
— *palustris* L. — Prairies marécageuses, assez rare.
Rhinanthus hirsutus Lmk. — Moissons, prairies, très-rare.
Euphrasia serotina Rchb. — Lieux incultes et moissons, assez rare.
Orobanche Rapum Thuill. — Parasite sur le *Sarothamnus*, assez commun.
— *minor* Sutt. — Champs de trèfle, assez rare.
Betonica officinalis L. — Bois, prairies, assez commun.
Scutellaria minor L. — Lieux humides et tourbeux, assez rare.
Bryonia dioica Jacq. — Haies, assez rare.
Sambucus Ebulus L. — Lieux cultivés, chemins, assez commun.
Viburnum Opulus L. — Bois, assez rare.
Lonicera Periclymenum L. — Bois, buissons, assez rare.
Galium saxatile L. — Bruyères, assez rare.
Valeriana dioica L. — Prairies marécageuses, assez rare.
Valerianella Auricula DC. — Moissons, très-rare.
Onopordon Acanthium L. — Chemins, décombres, assez rare.
Carlina vulgaris L. — Chemins, lieux secs, assez rare.
Cirsium oleraceum Scop. — Prairies spongieuses, assez rare.
— *oleraceo-palustre* Naeg. — 2 pieds seulement au bord d'un marécage.
Lappa major Gaertn. — Chemins, lieux incultes, assez commun.
Matricaria inodora L. — Moissons, assez rare.
Gnaphalium luteo-album L. — Champs sablonneux humides, assez rare.
Antennaria dioica Gaertn. — Bruyères, assez rare.
Filago apiculata G. E. Smith. — Lieux incultes, chemins, rare.

Pulicaria vulgaris Gaertn. — Bords des fossés, rare.
Inula Conyza DC. — Bois, chemins, assez rare.
Senecio sylvaticus L. — Bois, assez rare.
— *aquaticus* Huds. — Prairies humides, rare.
— *Fuchsii* Gmel. — Bords des eaux, très-rare.
Petasites vulgaris Desf. — Bords des eaux, assez commun.
Arnoseris minima Gaertn. — Moissons, assez commun.
Hypochaeris glabra L. — Moissons dans un seul champ, très-rare.
Scorzonera humilis L. — Prés humides, très-rare.
Hieracium Auricula L. — Lisière des bois, lieux frais, assez rare.
— *boreale* Fries. — Bois, buissons, assez rare.
Chenopodium hybridum L. — Bords d'un chemin, très-rare.
Rumex sanguineus L. — Lieux humides, assez rare.
Salix repens L. — Bruyères humides, assez rare.
Betula pubescens Ehrh. — Buissons du bord des marécages, très-rare.
Alisma ranunculoides L. — Bords des marais, très-rare.
Gymnadenia conopsea Rich. — Endroits humides, assez rare.
— *viridis* Rich. — Prairies, 3 pieds seulement.
Platanthera chlorantha Cust. — Bois, bruyères, assez commun.
— *bifolia* Rich. — Bois, bruyères, très-rare.
Epipactis latifolia All. — Bois, assez commun.
Triglochin palustre L. — Bords des endroits marécageux, assez rare.
Potamogeton polygonifolius Pourr. — Marécages, très-rare.
— *rufescens* Schrad. — Mares, ruisseaux, rare.
Lemna trisulca L. — Fossés, assez commun.
Sparganium simplex Huds. — Fossés, marécages, assez rare.
Juncus supinus Moench. — Endroits marécageux, très-commun.
— *obtusiflorus* Ehrh. — Bords des eaux, rare.
— *squarrosus* L. — Lieux sablonneux, assez commun.
— *Tenageia* L. — Marécages, très-rare.
Carex pulicaris L. — Prairies marécageuses, assez rare.
— *stellulata* Good. — Endroits marécageux, assez commun.
— *remota* L. — Endroits marécageux, assez rare.
— *pallescens* L. — Bois, prairies, assez rare.
— *flava* L. — Endroits marécageux, assez rare.
— *Oederi* Ehrh. — Endroits marécageux, très-rare.
— *ampullacea* Good. — Bords des eaux, commun.
Scirpus setaceus L. — Bords des étangs, rare.
Eriophorum angustifolium Roth. — Lieux marécageux, assez rare.
— *latifolium* Hoppe. — Lieux marécageux, très-rare.

Setaria glauca P. B. — Lieux cultivés, très-rare.
Alopecurus fulvus Sm. — Mares, fossés, assez rare.
Agrostis alba. L. — Bords d'un chemin, très-rare.
Aira caespitosa L. — Bois, lieux sablonneux, assez commun.
Melica uniflora Retz. — Lieux arides, très-rare.
Glyceria rigida Sm. — Bords d'un chemin, très-rare.
Bromus racemosus L. — Moissons, très-rare.
Festuca loliacea Huds. — Prairies fraîches, très-rare.
— *gigantea* Vill. — Bois, très-rare.
Nardus stricta L. — Pelouses arides, bruyères, assez rare.
Equisetum Telmateia L. — Marais, très-rare.

NB. Le marais de *Winghe-St-Georges*, village situé à environ une demi-lieue de Thielt-Notre-Dame, nous offre, outre une foule de plantes déjà nommées : *Ranunculus Lingua* L. — *Stellaria glauca* With. — *Sagina nodosa* Fenzl. — *Nymphaea alba* L. — *Utricularia vulgaris* L. — *Epipactis palustris* Crantz. — *Potamogeton obtusifolius* Mert. et Koch, *lucens* L. et *pusillus* L. — *Sparganium minimum* Huds. — *Scirpus lacustris* L. — *Scirpus fluitans* L. — *Juncus tenuis* Willd. — *Carex Pseudo-Cyperus* L. — et *Carex caespitosa* Gay non L. nec Good. Nous avons récolté dans le marais de Hauwaert, touchant à celui de Thielt-Notre-Dame, le rare *Potamogeton gramineus* L. et à Molenbeek-Wersbeek *Aspidium aculeatum* Sw.

—

Une promenade à Bousval, par F. Muller.

Au commencement du mois de juin dernier, M. et Mme De Trie, qui habitent le château de Paillant, près de Bousval, m'engagèrent à venir passer quelques jours avec eux. La propriété où je fus reçu est d'une contenance de cent trente hectares; elle est située dans une vallée charmante, dont le fond est assez humide. Dans la partie la plus basse, sont des étangs et des prairies marécageuses; à droite et à gauche, des collines sèches, où pousse une herbe maigre et chétive, entourent la végétation luxu-